

Herpes Genital Masculino y Femenino – Tratamiento Definitivo

Si no se presta atención a su sistema inmunológico, esta tomando un riesgo muy grave de crecimiento de la enfermedad del herpes genital (ya seas hombre o mujer) y el tumor doloroso, lo que desencadena el virus del herpes para el tratamiento del herpes en los genitales se requiere el seguimiento de este sistema.

Convencionalmente es conocido como el resfriado común, que aparece periódicamente en la mayoría de gente que vive cerca del mar – es 100% signo de una fuerte disminución de la inmunidad. Esto significa que el virus del herpes esta en el cuerpo activo.

El virus del herpes no sólo causa una erupción en las comisuras de los labios, herpes zoster, síndrome de fatiga crónica, varicela, y la esclerosis múltiple. Cuando la enfermedad es herpes genital (predominantemente de tipo 2, pero sucede a menudo la tipo 1 la infección que se produce a través del contacto sexual.) El virus del herpes en la mucosa entra en el sistema nervioso, donde puede estar un largo tiempo en estado “inactivo”. En el caso de estrés a las condiciones del cuerpo del virus del herpes se activa, los rendimientos de las células nerviosas en la piel y las membranas mucosas. Después de algún tiempo, la enfermedad ampollas del herpes genital se secan y se vuelven costras. Si las burbujas se lesionan al peinarse, contactos sexuales, fricción de la ropa, hay erosiones y úlceras, que, sin embargo, lo hacen sin la formación de cicatrices.

En las mujeres, el herpes genital se acompaña de una erupción, picazón y dolor en los genitales externos, labios grandes y pequeños. En el sitio de las lesiones de las burbujas de líquido claro formados, que a los 2-3 días de la enfermedad forman úlceras dolorosos, la curación es de aproximadamente 7-8 días. En este caso (no siempre) un aumento del dolor y de los ganglios linfáticos inguinales, fiebre, dolor de cabeza, cistitis herpética (mujeres): micción frecuente y dolorosa.

Puede tener la enfermedad asintomática del herpes genital en la localización de lesiones en el cuello uterino.

En los hombres, la enfermedad del herpes genital tiene síntomas similares, pero señala algunos otros proceso de localización: las erupciones estan generalmente ubicados en la cabeza del pene y el prepucio. La mayoría de los hombres desarrollan infección de la próstata, que se manifiesta por dolor en el perineo y dificultad para orinar. También es posible la localización de la enfermedad del herpes genital en el ano durante los contactos pertinentes, tanto en hombres como en mujeres y en pocos casos se puede hallar tratamiento para el herpes en el ano considerelo. En esta forma de la enfermedad de herpes genital los pacientes informan de un aumento del dolor.

[Haz clic aquí para leer todo el artículo](#)